

Anafilassi:

Un ritardo nel trattamento potrebbe essere fatale.*

Per sapere cos'è.

L'anafilassi è una reazione allergica grave e potenzialmente letale. Può essere scatenata da certi cibi (come le arachidi o i frutti di mare), punture d'insetto, medicinali, lattice, esercizio fisico e altra cause ignote.

I seguenti sintomi di anafilassi si possono verificare nel giro di minuti o di ore dall'esposizione a un fattore scatenante:

BOCCA: prurito, gonfiore delle labbra e/o della lingua

PELLE: prurito, orticaria, arrossamento, gonfiore

POLMONI*†: fiato corto, tosse, respiro affannoso

GOLA*†: prurito, contrazione, chiusura, raucedine

APPARATO DIGERENTE: vomito, diarrea, crampi

CUORE*†: pulsazioni deboli, vertigini, svenimento

* L'autoiniettore EpiPen® non è indicato per prevenire la morte associata all'anafilassi.
† Alcuni sintomi possono essere fatali. AGITE IN FRETTA!

Per sapere cosa fare.

L'epinefrina, il farmaco contenuto nell'autoiniettore EpiPen®, è il trattamento preferito per numerose reazioni allergiche. In presenza di uno dei seguenti sintomi, somministrare immediatamente l'autoiniettore EpiPen®.

Blu all'insù. Arancione alla coscia.

Come usare gli Autoiniettori EpiPen® ed EpiPen® Jr.



- Tenere saldamente con la punta arancione rivolta all'ingiù.
- Rimuovere il tappo blu di sicurezza tirando direttamente all'insù. Non piegare né flettere.



- Ruotare e premere saldamente la punta arancione al centro della parte esterna della coscia finché non si sente uno scatto.
- Tenere sulla coscia per alcuni secondi.



Protezione automatica dell'ago

- Dopo l'iniezione, il coperchio arancione si estende automaticamente per garantire che l'ago non sia mai esposto.

Dopo l'uso di EpiPen®, è necessario recarsi subito dal medico oppure al pronto soccorso. Per le successive 48 ore, restare in prossimità di un ospedale o di un luogo da cui si possa chiamare il pronto soccorso al numero 911.

Gli Autoiniettori di epinefrina EpiPen® ed EpiPen® Jr sono indicati nel trattamento d'emergenza delle reazioni anafilattiche nei pazienti ritenuti a maggior rischio di anafilassi, comprese persone che abbiano subito in precedenza reazioni anafilattiche. La posologia corretta è stabilita in relazione al peso corporeo del paziente.

Gli Autoiniettori EpiPen® ed EpiPen® Jr sono concepiti esclusivamente per la terapia d'emergenza. Non sostituiscono le successive cure mediche od ospedaliere. Dopo la somministrazione, i pazienti devono recarsi subito dal medico o al pronto soccorso. Per le successive 48 ore, i pazienti devono restare in prossimità di un ospedale o di un luogo da cui si possa chiamare il pronto soccorso al numero 911. Per assicurarsi che questo prodotto sia adatto a voi, leggere e seguire sempre le avvertenze riportate sull'etichetta. Per istruzioni complete su posologia e somministrazione, consultare il foglietto illustrativo accluso alla confezione.

Per maggiori informazioni o per scaricare una versione stampabile di questo poster, visitate il sito internet **EpiPen.ca**

Questo manifesto EpiPen® è stato tradotto testualmente da un APS approvato dalla PAAB.



©2015 Pfizer Canada Inc., Kirkland, Quebec H9J 2M5 • Numero verde gratuito: 1-877-EPIPEN1 (1-877-374-7361)
EpiPen® ed EpiPen® Jr sono marchi registrati di Mylan, Inc. concessi in licenza esclusiva alla propria filiale interamente controllata, Mylan Specialty, L.P., sub-licenziatario, Pfizer Canada Inc., Kirkland, Quebec H9J 2M5

Member
R&D
D000051643



Trusted for over 25 years.