

Blu all'insù. Arancione alla coscia.

Come usare gli Autoiniettori EpiPen® ed EpiPen® Jr.

Rimuovere l'autoiniettore EpiPen® dal tubo contenitore e seguire questi due semplici passaggi:



- Tenere saldamente con la punta arancione rivolta all'ingiù.
- **Rimuovere il tappo blu di sicurezza tirando direttamente all'insù. Non piegare né flettere.**



- **Ruotare e premere saldamente la punta arancione al centro della parte esterna della coscia finché non si sente uno scatto.**
- Tenere sulla coscia per alcuni secondi.



Protezione automatica dell'ago

- Dopo l'iniezione, il coperchio arancione si estende automaticamente per fare in modo che l'ago non resti mai esposto.

Dopo l'uso di EpiPen®, è necessario recarsi subito dal medico oppure al pronto soccorso. Per le successive 48 ore, restare in prossimità di un ospedale o di un luogo da cui si possa chiamare il pronto soccorso.



Trusted for over 25 years.

Informatevi. Preparatevi.

Visitate il sito internet **EpiPen.ca** per:

- Iscrivervi **GRATUITAMENTE** al Servizio Promemoria Scadenze
- Richiedere **GRATUITAMENTE** altri Kit di Addestramento EpiPen® e opuscoli informativi per familiari, amici e assistenti
- Imparate quali sono i segni e i sintomi dell'anafilassi
- Iscrivetevi per ricevere periodici aggiornamenti email su nuove risorse

Informazioni e risorse supplementari

- Food Allergy Canada: **foodallergycanada.ca**
- Allergy Asthma Information Association: **aaaia.ca**
- Allergy, Asthma & Immunology Society of Ontario: **allergyasthma.on.ca**
- Allergies Québec: **allergies-alimentaires.org**
- The Association of Allergists and Immunologists of Québec: **allerg.qc.ca**

Gli Autoiniettori di epinefrina EpiPen® ed EpiPen® Jr sono indicati nel trattamento d'emergenza delle reazioni anafilattiche nei pazienti ritenuti a maggior rischio di anafilassi, comprese persone che abbiano subito in precedenza reazioni anafilattiche. La posologia corretta è stabilita in relazione al peso corporeo del paziente.

Gli Autoiniettori EpiPen® ed EpiPen® Jr sono concepiti esclusivamente per la terapia d'emergenza. Non sostituiscono le successive cure mediche od ospedaliere. Dopo la somministrazione, i pazienti devono recarsi subito dal medico o al pronto soccorso. Per le successive 48 ore, i pazienti devono restare in prossimità di un ospedale o di un luogo da cui si possa chiamare il pronto soccorso. Per assicurarsi che questo prodotto sia adatto a voi, leggere e seguire sempre le avvertenze riportate sull'etichetta. Per istruzioni complete su posologia e somministrazione, consultare il foglietto illustrativo accluso alla confezione.

Il presente foglio d'istruzioni per l'EpiPen® è stato tradotto testualmente da un APS approvato dal PAAB.

© 2016 Pfizer Canada Inc., Kirkland, Quebec H9J 2M5 • Numero verde: 1-877-EPIPEN1 (1-877-374-7361)
EpiPen® ed EpiPen® Jr sono marchi registrati di Mylan, Inc. utilizzati su licenza esclusiva dalla relativa controllata al 100% Mylan Specialty, L.P.; concessi in licenza in subordine a Pfizer Canada Inc., Kirkland, Quebec H9J 2M5



MEMBER OF
INNOVATIVE MEDICINES CANADA



D000054513

Trusted for over 25 years.